



#### COMPOSIZIONE:

(E,Z)-2,13-Octadecadienyl acetate,  
(E,Z)-3,13-Octadecadienyl acetate  
(minimo garantito per diffusore 66 mg)

#### Classificazione CLP:



**ATTENZIONE**

#### Registrazione del Ministero della Salute:

n. 12836 del 14.03.2007

#### Confezioni:

pacco da 100 diffusori,  
cartone da 9000 diffusori

#### Conservazione:

in frigorifero (5°C) per 3 anni nella confezione originale

### Caratteristiche

Isonet® Z è un diffusore a rilascio controllato contenente il feromone sintetico chimicamente analogo a quello naturale di *Zeuzera Pyrina*, costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico di cui uno contenente il filo di alluminio che ne permette l'applicazione e l'altro riempito del feromone specifico.

# Isonet® Z

**Diffusore per la confusione sessuale per il controllo del Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*) e della Sesia del ribes (*Synanthedon tipuliformis*)**

## Monitoraggio e controlli in campo

Applicare le trappole di monitoraggio all'interno del frutteto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle periodicamente.

Di norma si ha un azzeramento quasi totale delle catture registrate.

L'applicazione del metodo della confusione sessuale non è da considerarsi immediatamente risolutivo nei confronti di questa specie che completa il proprio ciclo in 1 o 2 anni a seconda della pianta ospite, delle condizioni climatiche e del periodo di ovideposizione.

Ne consegue che per avere dei risultati evidenti, si consiglia la sua applicazione per più anni di seguito.

## Campi e dosi di impiego

<b>COLTURA</b>	Melo, pero, olivo, ribes
<b>DOSAGGIO</b>	300 diffusori/ha più il rinforzo sui bordi
<b>TIPO DI DIFFUSORE</b>	Singolo capillare
<b>EPOCA DI APPLICAZIONE</b>	Applicare il prodotto in campo <b>prima</b> della comparsa degli adulti della generazione svernante. Attorcigliare in modo lasco i diffusori sulle parti legnose della pianta, evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere o forzare eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	<i>Z. pyrina</i> può avere anche un ciclo biennale, a seconda delle zone geografiche di applicazione, quindi per valutare l'efficacia del metodo occorrono almeno due anni di applicazione

**BIO** **ShinEtsu**  
PHEROMONES

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.  
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

**AREA TECNICA, BIOGARD Division**  
47521 CESENA (FC) • Via Calcinaro 2085, int. 7  
Tel +39 0547 630 336 • Fax +39 0547 632 685  
email: [tecnicobiogard@cbceurope.it](mailto:tecnicobiogard@cbceurope.it) • [www.biogard.it](http://www.biogard.it)

**BIOGARD®**  
biological First.