

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
ZOLFO puro (esente da selenio) g 51,7 (700 g/l)
Coformulanti, q.b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H318: Provoca gravi lesioni oculari.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare

guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ACTION PIN S.A.

30 rue Gambetta – 40100 DAX (Francia)
Tel.: +33 05-58550700

Registrazione del Ministero della Sanità
N. 11102 del 29.11.2001

Officina di produzione:

S.I.P.C. - Rue J. Coste – COURCHELLETES (Francia)

Officina di confezionamento:

I.R.C.A. Service S.p.A.
S.S. Cremasca 591, n. 10 - 24040 - FORNOVO S.GIOVANNI (BG)

Distribuito da:

CBC (Europe) S.r.l.
Via E. Majorana, 2 - 20834 NOVA MILANESE (MB)
Tel. 0362-365079

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempiere i 2/3 della botte con acqua. Versare la dose prestabilita di HELIOSOUFRE S. Sotto agitazione aggiungere altri eventuali prodotti complementari. Completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ

Introdurre il prodotto per primo nella botte. HELIOSOUFRE S non è compatibile con antiparassitari alcalini (solfosifuri, poltiglia bordeolese, ecc.), con oli minerali, con captano.

AVVERTENZA - il formulato deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

COMPATIBILITÀ

Introdurre il prodotto per primo nella botte. HELIOSOUFRE S non è compatibile con antiparassitari alcalini (solfosifuri, poltiglia bordeolese, ecc.), con oli minerali, con captano.

FITOTOSSICITÀ: può arrecare danno alle seguenti cultivar: mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, Golden delicious e le sue cultivar clone), pere (Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Decana del Comizio) ed alle Cucurbitacee, su alcune cultivar di melone; si raccomanda pertanto di effettuare saggi preliminari prima dell'impiego.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

FUNGICIDA ED ACARICIDA A BASE DI ZOLFO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA

Heliosoufre S®



Biogard
Molecolari First.

Contenuto netto 1000 ml

Coltura	Avversità	Dose (l/ha)	Acqua l/ha	N. trattamenti	Intervallo	Epoca d'impiego
Vite (da vino e da tavola)	Oidio	3-5	200-1000	2-12	7 gg	Dalle prime foglie distese fino all'invaiatura
	Erimosi e Acariosi	7,5	80-1000	1-4	7 gg	Da gemma cotonosa a invaiatura
Pomacee (melo e pero)	Oidio	3-5	500-1500	2-12	7 gg	Pre e post fioritura
	Ticchiolatura	2-7	500-1500	2-12	7 gg	Pre e post fioritura
Drupacee (Albicocco, pesco e nectarine)	Oidio	3-5	500-1500	2-12	7 gg	Da post fioritura a prima della maturazione
Susino	<i>Taphrina</i> sp.	1,25-6	500-1500	1-4	7 gg	Trattamenti invernali e ad inizio primavera
Nocciolo	Oidio	3,5-5	500-1500	1-11	7 gg	Dal germogliamento all'ingrossamento dei frutti
Olivo	Acari	1-6	500-1500	2-6	7 gg	Da inizio infestazione
Frumento, Orzo, Avena Triticale	Oidio	4-5	80-250	1-2	10 gg	Da accostamento a inizio spigatura
Barbabietola da zucchero e da foraggio	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa
Soia	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa
Girasole	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa
Pomodoro (in pieno campo e in serra)	Acari (<i>Aculops lycopersici</i>)	1,5-7	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Patata	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Orticole varie* (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Fragola (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Rosa (Impiego in pieno campo e serra), Forestali, Ornamentali (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	500-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa

*Orticole varie: Bietole, Carciofo, Carota, Cavolo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Cicoria, Indivia, Indivia riccia, Lattuga, Crescione, Scarola, Valerianella, Melanzana, Peperone, Pisello (da industria), Prezzemolo, Scorzonera, Sedano, Tarassaco, Zucchini.

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
- Da non applicare con mezzi aerei.
- Operare in assenza di vento.
- Da non vendersi sfuso.
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

- Il contenitore non può essere riutilizzato.
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 23/02/2018.



Rev 03-2018