Confezioni da 1 e 4 litri

SU UVA DA TAVOLA VAPOR GARD®

- **RIDUCE LA TRASPIRAZIONE**
- **PROTEGGE DA STRESS IDRICI**
- **GARANTISCE UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL'UVA IN POST-RACCOLTA**

AZIONE

VAPOR GARD forma sulla vegetazione una pellicola semipermeabile trasparente in grado di modificare i flussi di linfa nella pianta e regolarne la traspirazione.
In caso di periodi caldi ed asciutti l'uso preventivo di **VAPOR GARD** limita gli eccessi di evaporazione con conseguenti benefici effetti sulla riduzione di alcune fisiopatie (es. disseccamento del rachide).
In pre-raccolta, la riduzione della traspirazione attraverso le lenticelle presenti sull'acino aumenta la conservabilità dell'uva in post-raccolta.
La migliore strategia prevede l'uso del **VAPOR GARD** in associazione a **LIXOR CALCIUM + MG** (3 kg/ha): tale apporto di calcio contribuisce a migliorare l'elasticità dei tessuti ed esalta il sapore dei frutti.

MODALITÀ D'USO

Epoca	Dose	Note
Pre-copertura con teli o caldo eccessivo	0,6-0,8 % (4 lt/ha)	Bagnare uniformemente la vegetazione (300-600 lt/ha)
Da inizio invaiatura a raccolta	0,4-0,8 % (2-4 lt/ha)	

BIOGARD®
biological First.

www.biogard.it