

Shin Etsu
PHEROMONES



COMPOSIZIONE:

(E,Z)-7,9-Dodecadienil
acetato min. 524 g/kg
(Z)-9-Dodecenil acetato .. min. 61 g/kg
(Z)-11-Tetradecenil
acetato min. 200 g/kg
(Z)-9-Tetradecenil acetato . min. 11 g/kg

Classificazione CLP



Tempo di carenza:

non richiesto

Registrazione del Ministero della Salute:

nr. 16552 del 05.02.2016

Confezioni:

pacco da 100 diffusori
cartone da 5.600 diffusori

Conservazione:

nell'imballo originale ed a temperatura
non superiore a 5 °C il prodotto si
conserva per 3 anni.



Foto: A. Lucchi
Adulto di Tignoletta

ISONET® L A PLUS

Per il controllo di *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite), *Eupoecilia ambiguella* (Tignola della vite), *Argyrotaenia ljungiana* (Eulia dei fruttiferi e della vite)

Isonet® L A plus è un diffusore a rilascio controllato del feromone sintetico chimicamente analogo a quello naturale della *Lobesia botrana* (Tignoletta della vite), di *Eupoecilia ambiguella* (Tignola della vite) e *Argyrotaenia ljungiana* (Eulia dei fruttiferi e della vite). Il prodotto è costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico entrambi pieni di feromone specifico saldati alle estremità e aperti al centro per permettere l'applicazione sulla pianta. Appendere i diffusori a 1-2 m d'altezza secondo la tipologia di vite, evitando l'esposizione diretta al sole. Non aprire con forza per evitare la rottura del diffusore e la conseguente impossibilità di applicazione.

La confusione sessuale funziona attraverso la distribuzione omogenea del feromone nell'ambiente della coltivazione da difendere. Questo risultato si ottiene applicando nel vigneto il dosaggio, consigliato in etichetta, di Isonet® L A plus che rilascia continuamente il feromone. Il miglior risultato si ottiene quando l'applicazione si esegue per grande aree. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti non trattati col metodo della confusione.

Una sola applicazione di Isonet® L A plus garantisce la copertura di tutta l'attività di volo delle specie bersaglio.

Isonet® L A plus deve essere applicato **PRIMA** dell'inizio del volo della generazione svernante.

L'applicazione della confusione sessuale non è da considerarsi alternativa alla difesa fitoiatrica ma invece complementare, a seconda delle condizioni

dell'area di applicazione. All'interno di vigneti con forti infestazioni storiche di tignoletta e di tignola si possono verificare, infatti, accoppiamenti casuali, non mediati dall'attrazione feromonica delle femmine nei confronti dei maschi. Inoltre femmine fecondate provenienti da vigneti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti.

Per tale motivo, l'applicazione della confusione sessuale necessita di frequenti controlli di campo per mantenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione del fitofago e intervenire tempestivamente per abbassare le popolazioni qualora necessario.

È necessario posizionare le trappole di monitoraggio all'interno del vigneto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle settimanalmente. Normalmente si ha un azzeramento quasi totale delle catture.

I controlli in prima generazione sono molto importanti per determinare l'eventuale necessità di un trattamento chimico integrativo. Controllare almeno un centinaio di grappoli al centro e lungo i bordi dell'area trattata e programmare una difesa sulla seconda generazione nel caso si superi la soglia indicativa di 5-8% di grappoli con nidi. In caso contrario, verificare la presenza delle uova in seconda ed in terza generazione per una stima precoce del rischio. Al termine della seconda generazione effettuare un rilievo con le stesse modalità di quello eseguito sulla prima.



Foto: A. Lucchi
Adulto di Eulia



Foto: A. Lucchi
Adulto di Tignola

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURA

Prodotto a base di feromoni specifici, con uso prevalente su Vite

DOSAGGIO

500 diffusori/ha secondo la tipologia della vite, la dimensione del vigneto e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi rispettando il dosaggio massimo per ettaro

TIPO DI DIFFUSORE

Doppio capillare; entrambi contenente feromone