



ISOMATE® A/OFM

per il controllo di *Grapholita molesta* (Tignola orientale del pesco) e *Anarsia lineatella* (Anarsia dei fruttiferi)



COMPOSIZIONE:

(Z)-8-Dodecenyl acetate,
(E)-8-Dodecenyl acetate,
(Z)-8-Dodecen-1-ol,
(E)-5-Decenyl acetate,
(E)-5-Decen-1-ol
(minimo garantito per diffusore 290 mg)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Tempo di carenza:

non richiesto

Registrazione del Ministero della Salute:

n. 14709 del 11.05.2010

Confezioni:

pacco da 200 diffusori,
cartone da 3.600 diffusori

Conservazione:

in frigorifero (5°C) per 3 anni
nella confezione originale

Isomate® A/OFM è un diffusore a rilascio controllato contenente il feromone di *Grapholita molesta* e *Anarsia lineatella*. Il prodotto è costituito da due tubi paralleli di materiale polimerico entrambi pieni del feromone specifico saldati alle estremità e aperti al centro per permettere l'applicazione sulla pianta. Appendere i diffusori sulle parti legnose della pianta evitando l'esposizione diretta al sole. Non forzare eccessivamente l'apertura per evitare la rottura del diffusore. Con piante di altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

La confusione sessuale funziona attraverso la distribuzione omogenea del feromone nell'ambiente della coltivazione da difendere. Questo risultato si ottiene applicando nel frutteto il dosaggio, consigliato in etichetta, di Isomate® A/OFM che rilascia continuamente il feromone. Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi utilizzare il dosaggio più alto per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.

Una sola applicazione di Isomate® A/OFM garantisce la copertura di tutta l'attività di volo della Tignola del pesco e dell'*Anarsia* dei fruttiferi.

Isomate® A/OFM deve essere applicato PRIMA dell'avvio delle catture della generazione della

specie più precoce e cioè *G. molesta*.

L'applicazione della confusione sessuale non è da considerarsi alternativa alla difesa fitoiatrica ma invece complementare, a seconda delle condizioni dell'area di applicazione. All'interno di frutteti con forti infestazioni storiche di *G. molesta* o di *A. lineatella* si possono verificare, infatti, accoppiamenti casuali, non mediati dall'attrazione feromonica delle femmine nei confronti dei maschi. Inoltre femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti.

Per tale motivo, l'applicazione della confusione sessuale necessita di frequenti campionamenti di campo per mantenere sotto controllo l'evoluzione della popolazione del fitofago e intervenire tempestivamente per abbassare le popolazioni qualora necessario.

È necessario posizionare le trappole di monitoraggio all'interno del frutteto e lungo i bordi delle aree in confusione e ispezionarle settimanalmente. Normalmente si ha un azzeramento quasi totale delle catture.

I controlli in 1ª generazione sono molto importanti per determinare l'eventuale necessità di un trattamento integrativo. Nel pesco controllare almeno 200 germogli/frutti sia al centro che lungo i bordi dell'appezzamento alla fine dello sviluppo larvale di 1ª generazione.

Considerare la possibilità di effettuare un intervento insetticida di supporto quando il grado di attacco sui getti si attesta sul 2-3%.



Adulto di *G. molesta*



Adulto di *A. lineatella*

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

COLTURA

Registrazione indipendente dalla coltura, ma di uso prevalente su Drupeacee

DOSAGGIO

800 - 1.000 diffusori/ha più il rinforzo sui bordi

TIPO DI DIFFUSORE

Doppio capillare; entrambi contenenti feromone

