

PRODOTTI PER LA DIFESA

LITTOVIR®

BIOINSETTICIDA
IN SOSPENSIONE
CONCENTRATA A BASE DI
SPODOPTERA LITTORALIS
NUCLEOPOLIEDROVIRUS
(SpINPV) CHE AGISCE
PER INGESTIONE
CONTRO LARVE DI
NOTTUA MEDITERRANEA
(*SPODOPTERA*
LITTORALIS)



BIOGARD
divulgazione First

Contenuto netto 100 ml

COMPOSIZIONE: 100 grammi di prodotto contengono: *Spodoptera littoralis* nucleopoliedrovirus, isolato DSMZ BV-0005 (minimo 5 x 10¹¹ granuli/litro).....g 1
Coformulanti q.b. a.....g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Contiene *Spodoptera littoralis* NPV. Può provocare una reazione allergica.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG)

Tel. 035-335313

Registrazione n. 14949 del 25.07.2012 del Ministero della Salute

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO

Andermatt Biocontrol Suisse AG

Stahlermatten 6 - CH-6146 Gossdrietwil

Riferimento Partita e data di fabbricazione vedere apposito spazio.

LITTOVIR® è un marchio registrato da Andermatt Group AG.

NORME PRECAUZIONALI

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

CARATTERISTICHE - LITTOVIR® è un insetticida a base di *Spodoptera littoralis* nucleopoliedrovirus (SpINPV). Essendo un prodotto altamente selettivo, LITTOVIR® non presenta alcun pericolo per le api, nessuna tossicità per altri insetti utili, per i pesci e per i mammiferi. LITTOVIR® è un virus presente in natura e non lascia dunque alcun tipo di residuo sulle piante. LITTOVIR® è particolarmente indicato per il trattamento delle colture sia in regime di agricoltura integrata che biologica.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO - Per il controllo della Nottua mediterranea (*Spodoptera littoralis*), in pieno campo e/o in serra, nelle colture ortive (pomodoro, peperone, melanzana, spinacio, lattuga e simili, erbe fresche), ornamentali e su fragola.

Dosi di impiego: 100 - 200 ml/ha, pari a 10 - 50 ml/hl, utilizzando 400 - 1000 l/ha di acqua per applicazione. In tutte le applicazioni non superare le dosi massime di prodotto indicate ad ettaro.

MODALITA' D'IMPIEGO - LITTOVIR® è efficace contro le giovani larve di *Spodoptera littoralis* delle quali provoca la morte in alcuni giorni. Deve essere applicato poco prima e/o durante la schiusura delle uova. La data del primo trattamento dipende dal livello di infestazione presente; iniziare i trattamenti alla comparsa delle prime larve e danni. Se possibile,

trattare la sera. Il prodotto fitosanitario è sensibile ai raggi UV. Sono necessari 2-3 trattamenti per generazione, ai dosaggi raccomandati. In pieno campo, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli di circa 8 giorni soleggiati (2 giorni parzialmente soleggiati = 1 giorno di pieno sole). In serra, i trattamenti successivi a quello di apertura devono essere ripetuti ad intervalli al massimo di 14 giorni.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE - Dopo aver riempito l'irroratore d'acqua (da 400 a 1000 litri/ha), versare la quantità di LITTOVIR® necessaria. Il volume di acqua da utilizzare è in funzione della forma di allevamento e dello stadio vegetativo delle piante (sviluppo della superficie fogliare per ettaro) oltre che al tipo di irroratore utilizzato. Al momento del trattamento le piante non devono essere umide per pioggia o rugiada. Assicurare una buona e uniforme bagnatura di tutte le parti vegetali.

PRECAUZIONI - Evitare l'uso di acqua con pH inferiore a 5 e superiore a 8, altrimenti utilizzare un prodotto tampone.

COMPATIBILITA' - LITTOVIR® non è compatibile con i prodotti a base di rame e prodotti a reazione molto alcalina (poltiglia bordolese, polisolfuri, ecc.).

CONSERVAZIONE - LITTOVIR® va conservato in un normale frigorifero a 4 - 6 °C ed è stabile per almeno 3 anni. A temperatura ambiente (30 °C) LITTOVIR® ha una stabilità di almeno 2 settimane. Il prodotto può essere conservato anche in congelatore.

FITOTOSSICITA' - Alle normali dosi d'impiego il prodotto non è fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 28/01/2020 e modificata ai sensi dell'art 7, comma 1 del D.P.R n. 55/2012, con validità dal 11/12/2021.

Rev. 10-2021

