

# NeemAzal<sup>®</sup>-T/S

## Tabella di compatibilità

Novembre  
2025

**ATTENZIONE:** essendo NeemAzal-T/S un'emulsione concentrata su base oleosa, non miscelare con prodotti non compatibili con olii in genere e preparati contenenti olio (per es. SE, OD, EC) in quanto la miscela potrebbe risultare fitotossica. Mantenere un intervallo di precauzione tra l'applicazione di questi prodotti ed il trattamento con NeemAzal-T/S di almeno 7 giorni o più, se non diversamente specificato dalle norme precauzionali prescritte sulla confezione del prodotto. Prima di effettuare applicazioni su larga scala, è consigliabile l'effettuazione di saggi preliminari su piccole superfici.

### LEGENDA

<b>SI</b>	<b>COMPATIBILE, quindi miscibile in botte con NeemAzal-T/S.</b>
<b>P</b>	<b>PARZIALMENTE COMPATIBILE, miscela non consigliata oppure miscela possibile solo per il contesto specificato (coltura, dose);</b> per i casi non specificati, effettuare un saggio preliminare su una piccola parte della coltura per verificare l'assenza di fitotossicità.
<b>NO</b>	<b>NON COMPATIBILE, può causare fitotossicità sulle colture se miscelato con NeemAzal-T/S;</b> distanziare l'applicazione del formulato da quello con NeemAzal-T/S di almeno 7 giorni prima e/o dopo.

<sup>(1)</sup> Se si ritiene necessario effettuare la miscela con il prodotto indicato, si consiglia di non superare la concentrazione di 500 mL/100 L di NeemAzal-T/S.  
**Evitare sempre la miscela di NeemAzal-T/S con prodotti a reazione alcalina (pH risultante > 7), che potrebbero inibirne l'efficacia (e.g. saponi potassici).**

## FUNGICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE, DOSE (coltura testata, L/ha o mL/100 L NeemAzal-T/S)	MISCIBILITA'
Argille acide	ARGILLE ACIDE BIOGARD	NO
<i>Aureobasidium pullulans</i> , ceppi DSM 14940 e DSM 14941	BLOSSOM PROTECT NEW, BOTECTOR	SI
Bicarbonato di potassio	vari	NO
Captano	vari	NO
Cyprodinil	CHORUS	SI
Dithianon	DELAN	NO
Dithianon, fosfonato di potassio	DELAN PRO	NO
Dodina	SYLLIT	NO
Fenhexamid	TELDOR 0,1% (giovani piante di <i>Brachyscome</i> , <i>Nemesia</i> , <i>Diascia</i> )	P
Folpet	vari	NO
Polisolfuro di calcio	vari	NO
Poltiglia bordolese	vari	NO
Pyraclostrobin, boscalid	SIGNUM 0,1 e 0,15% (piante madri di <i>Erysium</i> )	P
Zolfo	KUMULUS DF	SI

# INSETTICIDI/ACARICIDI

PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE, DOSE (coltura testata, L/ha o mL/100 L NeemAzal-T/S)	MISCIBILITA'
<i>Bacillus thuringiensis</i>	LEPINOX WG, RAPAX AS, DELFIN, DIPEL DF, XENTARI	SI
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo ATTCC 74040	NATURALIS	SI
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo GHA	BOTANIGARD WP (Rosa, 62 mL/100 L)	P
Bifenazate	FLORAMITE 240 SC (Crisantemo 2,5 L)	P
Etozazole	BORNEO (Crisantemo, 2,5 L)	P
Flonicamid	TEPPEKI	SI
Isolati di Baculovirus, Granulovirus	CAPEX PLUS, MADEX TOP, MADEX TWIN, TUTAVIR	SI
Lambda-cialotrina	KARATE ZEON 0,05% (Calibrachoa, Crisantemo)	P
Olio di arancio dolce	PREV-AM	P
Olio paraffinici, olii estivi <sup>(1)</sup>	UFO e vari	SI
Sali potassici di acidi grassi	NEUDOSAN, FLIPPER, SAPONE MOLLE	NO
Spinosad	SPINTOR (Crisantemo 2,5 L; Rosa 62 mL/100 L)	P

**N.B. Si consiglia, per quanto possibile, di utilizzare NeemAzal-T/S da solo.** Altre formulazioni della stessa sostanza attiva potrebbero determinare reazioni diverse sulla coltura se miscelate con NeemAzal-T/S. Nel caso delle miscele di 2 o più formulati, considerare sempre il caso peggiore. CBC (Europe) S.r.l., il distributore e il rivenditore declinano ogni responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso dei prodotti elencati in questa tabella.

Per ogni ulteriore informazione contattare:



**BIOGARD –AREA TECNICA, Divisione di CBC (Europe) S.r.l.**

Via Civinelli 1090, 47522 Cesena (FC), Italy

Tel. +39 0547 630336 e-mail: [tecnicobiogard@cbceurope.it](mailto:tecnicobiogard@cbceurope.it)