



POLVERE DI ROCCIA

Corroborante - Potenziatore delle difese delle piante.



COMPOSIZIONE:

Caolino100 % peso/peso

Formulazione:

Polvere bagnabile

Confezioni:

sacco da 25 kg
pallet da 1000 Kg

Conservazione:

in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5 e 45 °C.

Si tratta di un formulato a base di caolino, che ha subito un processo di macinazione meccanica che permette di eliminare tutte le impurità e ne garantisce una speciale colorazione bianca, fattore chiave per il successo applicativo. Il prodotto contiene il 100% di silicato di alluminio specificatamente formulato per trattamenti fogliari in sospensione acquosa. Il caolino è una sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

Il caolino una volta distribuito sulla vegetazione forma un sottile strato di colore bianco che riflette i raggi solari e svolge un'azione fisica nei confronti di diversi insetti nocivi, che così faticano ad individuare la coltura. Inoltre permette di limitare gli stress termici e le scottature.

MODALITÀ DI IMPIEGO: Riempire l'atomizzatore per metà e mantenere in agitazione, quindi aggiungere il dosaggio di caolino (che può essere anche preventivamente disciolto in un secchio) e portare l'acqua al volume desiderato. La pressione di esercizio dell'atomizzatore deve mantenersi al di sotto di 8 bar, in modo da ottenere gocce di dimensione tra 100 e i 200 micron. Mantenere la sospensione in agitazione per tutto il tempo del trattamento e una volta terminata l'applicazione ripulire l'attrezzatura con acqua corrente onde evitare depositi

di prodotto nei circuiti dell'atomizzatore. Durante l'applicazione assicurarsi di bagnare accuratamente tutta la vegetazione: la qualità dell'applicazione è decisiva per ottenere la massima efficacia del prodotto. In particolare è opportuno controllare che la parte superiore della vegetazione sia stata adeguatamente coperta. In seguito a piogge superiori ai 20-25 mm è meglio ripetere l'applicazione, in quanto buona parte del prodotto può essere stata dilavata.

- Il primo trattamento deve essere eseguito con 30-50 kg di prodotto/ha con almeno 600-1000 litri di volume di acqua (oppure 2 applicazioni a 30 kg/ha applicati in direzione incrociata a 3 giorni di intervallo uno dall'altro);
- Il secondo trattamento va eseguito a 20-30 Kg/ha a 10 giorni dalla prima applicazione;
- Il terzo e gli eventuali ulteriori trattamenti dovranno essere eseguiti a 20-30 giorni dall'ultimo intervento sempre con 20-30 kg/ha di prodotto.

AVVERTENZE: Non presenta controindicazioni di miscibilità con agrofarmaci e altri formulati, anche se è sempre consigliabile effettuare piccoli saggi per verificarne la compatibilità. Inserire il caolino sempre per primo. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5 e 45 °C.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

	DOSAGGIO	MODALITÀ	EPOCA DI APPLICAZIONE
primo trattamento	30-50 kg/ha	Il primo trattamento deve essere eseguito con un volume di acqua adeguato ad assicurare una ottimale copertura	
secondo trattamento	20-30 kg/ha		a circa 10 giorni dalla prima applicazione
terzo e gli eventuali ulteriori trattamenti	20-30 kg/ha		a 20-30 giorni dall'ultimo intervento

