

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
Bacillus thuringiensis sottospecie *kurstaki*
ceppo EG 2348 g 18,80 (= 226 g/L)
Coformulanti q.b. a g 100
Potenza: 24.000 U.I. *Tni* /mg di formulato.
Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO:

I microrganismi possono potenzialmente causare reazioni di sensibilizzazione.
EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25
24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

Officina di produzione e confezionamento:

CBC (Europe) S.r.l. - Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG)

Registrazione n. 16295 del 20/09/2017 del Ministero della Salute

Riferimento Partita e data di fabbricazione: vedere apposito spazio.

RAPAX® è un marchio registrato da CBC (Europe) S.r.l.

Il prodotto è stabile per 3 anni a temperatura ambiente (20 °C).

Informazioni per il medico: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il

medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Indossare idonei dispositivi di protezione respiratoria durante l'applicazione.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE

RAPAX® AS può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le parti vegetali infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere RAPAX® AS. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versarne la metà nell'irroratore, rigiarare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare la miscela o sospensione preparata se non applicata entro 12 ore dalla preparazione. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

CARATTERISTICHE

RAPAX® AS è un insetticida microbiologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, preferibilmente ai primi stadi larvali. Dopo aver consumato la dose letale di RAPAX® AS, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulla vegetazione qualche giorno prima di morire. Una buona e accurata copertura della vegetazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali.



RAPAX® AS

**Formulazione
in sospensione
concentrata (SC)
acquosa
INSETTICIDA
MICROBIOLOGICO
A BASE DI *BACILLUS
THURINGIENSIS*
CONTRO LARVE DI
LEPIDOTTERI**

**Meccanismo di Azione:
IRAC 11A**

BIOGARD®
biological First.

Contenuto netto 1 litro

PRODOTTI PER LA DIFESA

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

FRUTTIFERI

- **Pomacee (melo, pero, cotogno):** Tortricidi (*Adoxophyes orana*, *Pandemis cerasana*, *Archips podana*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Drupeace (pesco, nettarine, percoche, albicocco, susino, ciliegio):** Tignola orientale del pesco (*Grapholita molesta*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Falena invernale (*Operophtera brumata*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Kiwi:** Eulia (*Argyrotaenia jurgiana*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Agrumi:** Tignola degli agrumi (*Prays citri*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Olivo:** Tignola dell'olivo (*Prays oleae*), Margarona dell'olivo (*Palpita vitrealis*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.

VITE DA VINO E UVA DA TAVOLA: Tignole della vite (*Eupoecilia ambiguella*, *Lobesia botrana*, *Ephesia* spp., *Cryptoblabes gnidiella*) 0,75-1 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 100-1500 L/ha.

ORTAGGI

- **Fagiolo e fagiolino:** Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 L/ha. Impiego in campo e in serra.
- **Carciofo:** Nottua del carciofo (*Gortyna xanthene*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 L/ha.
- **Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchini, cetriolo):** Nottue (*Spodoptera littoralis*, *Helicoverpa armigera*, *Agrotis* spp., *Chrysodeixis chalcites*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.
- **Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana):** Nottue (*Spodoptera littoralis*, *Chrysodeixis chalcites*, *Agrotis segetum*), Piraleide (*Ostrinia nubilalis*), Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*), Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*), Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*), Mamestra (*Mamestra brassicae*, *Mamestra oleracea*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.

FLOREALI ed ORNAMENTALI: Nottue 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.

FORESTALI: Ifantria (*Hyphantria cunea*), Limantria (*Lymantria dispar*, *Lymantria monacha*), Iponomeutide (*Yponomeuta padella*), Processionarie (*Thaumetopoea pityocampa*, *Thaumetopoea proceionea*), Tortricide verde (*Tortrix viridana*), Bombe dal ventre bruno (*Euproctis chrysorrhoea*), Tortrice delle gemme apicali del pino (*Evetria buoliana*), Bombe gallonate (*Malacosoma neustria*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-2000 L/ha.

COTONE, TABACCO: Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1500 L/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani. Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di RAPAX® AS in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

Numero massimo di trattamenti: 3.

INTERVALLO DI PRE-RACCOLTA: due giorni per i vegetali destinati al consumo fresco (carciofo, solanacee).

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE

Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato. A temperatura ambiente (20 °C) il prodotto è stabile per 3 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese, etc.

FITOTOSSICITÀ

Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento.

Etichetta autorizzata con D.D. del 22.10.2025



Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

BIO

IT

Rev. 10-2025