

**COMPOSIZIONE:**

100 grammi di prodotto contengono:  
*Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*  
 ceppo EG 2348 ..... g 18,80  
 Coformulanti q.b. a ..... g 100  
 Potenza: 24.000 U.I. *Tni*/mg di formulato.  
 Agisce per ingestione contro larve di lepidotteri.

**ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
 P280: Indossare guanti/indumenti protettivi.  
 P301+P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
 P332+P313: In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.  
 P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:**

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
 SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
 Contiene *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki* ceppo EG 2348. Può provocare una reazione allergica. Indossare guanti ed indumenti di protezione per agenti biologici, tipo 6-B secondo la norma UNE EN14126:2004. Indossare maschera respiratoria del tipo FFP3 secondo la norma UNE EN 149:2001+A1:2010 o maschera con filtro del tipo P2 in conformità alle norme UNE EN 143:2001, UNE EN 143/AC:2002, UNE EN143:2001/AC:2005, UNE EN 143:2001/A1:2006.

**CBC** (Europe) S.r.l.  
 Via Zanica, 25  
 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035-335313

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO S.T.I.** Solfotecnica Italiana S.p.A.  
 Via Evangelista Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)  
 Registrazione n. 16295 del 20/09/2017 del Ministero della Salute

Riferimento Partita e data di fabbricazione: vedere apposito spazio.

**RAPAX®** è un marchio registrato da **CBC** (Europe) S.r.l.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**NORME PRECAUZIONALI**

Conservare il recipiente ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

**AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato; a temperatura ambiente (20 °C) il prodotto è stabile per 3 anni; chiudere ermeticamente la confezione se parzialmente utilizzata.

**CARATTERISTICHE**

RAPAX® AS è un insetticida biologico ad elevata specificità di azione contro le larve di lepidotteri. Le larve per infettarsi devono ingerire il prodotto: trattare larve giovani che si nutrono con voracità, prima che si sia verificato un eccessivo danno. Effettuare gli interventi quando i fitofagi sono all'esterno del vegetale e, preferibilmente ai primi stadi larvali. Dopo aver consumato la dose letale di RAPAX® AS, le larve cessano di alimentarsi ma possono rimanere sulla vegetazione qualche giorno prima di morire. Una buona e accurata copertura della vegetazione è essenziale per un buon controllo degli insetti. Su alcune colture può essere necessario l'uso degli ugelli direzionali. Intervenire con attrezzature che permettono una buona copertura della vegetazione trattata.

**PRECAUZIONI**

Evitare l'uso di acqua con pH superiore a 8 o utilizzare un prodotto tampone.

**COMPATIBILITÀ**

Il prodotto non è miscibile con prodotti alcalini quali Poltiglia Bordolese etc.

**FITOTOSSICITÀ**

Fare attenzione alle miscele di RAPAX® AS con altri prodotti a base di olio o agenti bagnanti poiché potrebbero aumentare il rischio di fitotossicità. In caso si notino fenomeni di fitotossicità, sospendere immediatamente i trattamenti.



**RAPAX® AS**

**BIOINSETTICIDA  
 IN SOSPENSIONE  
 CONCENTRATA  
 ACQUOSA A BASE  
 DI BACILLUS  
 THURINGIENSIS  
 CONTRO LARVE DI  
 LEPIDOTTERI**



**BIOGARD®**  
 biological First.

Contenuto netto 1000 ml

**CAMPI, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO FRUTTIFERI**

- **Pomace (melo, pero, cotogno):** Tortricidi (*Adoxophyes orana*, *Pandemis cerasana*, *Archips podana*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Drupacee (pesco, nectarine, percoche, albicocco, susino, ciliegio):** Tignola orientale del pesco (*Grapholita molesta*), Anarsia (*Anarsia lineatella*), Falena invernale (*Operophtera brumata*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Kivi:** Eulia (*Argyrotaenia jurgiana*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Agrumi:** Tignola degli agrumi (*Prays citri*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.
- **Olivo:** Tignola dell'olivo (*Prays oleae*), Margaronia dell'olivo (*Palpita vitrealis*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.

**VITE DA VINO E UVA DA TAVOLA:** Tignole della vite (*Eupoecilia ambiguella*, *Lobesia botrana*, *Ephesia* spp., *Cryptoblabes gnidiella*) 0,75-1 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 100-1500 L/ha.

**ORTAGGI**

- **Fagiolo e fagiolino:** Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 L/ha. Impiego in campo e in serra.
- **Carciofo:** Nottua del carciofo (*Gortyna xanthenes*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1000 L/ha.
- **Cucurbitacee (cocomero, melone, zucca, zucchini, cetriolo):** Nottue (*Spodoptera littoralis*, *Helicoverpa armigera*, *Agrotis* spp., *Chrysodeixis chalcites*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.
- **Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana):** Nottue (*Spodoptera littoralis*, *Chrysodeixis chalcites*, *Agrotis segetum*), Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Tignola della patata (*Phthorimaea operculella*), Tignola del pomodoro (*Tuta absoluta*), Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*), Mamestra (*Mamestra brassicae*, *Mamestra oleracea*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.

**FLOREALI ed ORNAMENTALI:** Nottue 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-1500 L/ha. Impiego in campo e in serra.

**FORESTALI:** Ifantria (*Hypphantria cunea*), Limantria (*Lymantria dispar*, *Lymantria monacha*), Ipononeutide (*Yponomeuta padella*), Processionarie (*Thaumetopoea pityocampa*, *Thaumetopoea processionea*), Tortricide verde (*Tortrix viridana*), Bombice dal ventre bruno (*Euproctis chrysorrhoea*), Tortrice delle gemme apicali del pino (*Evtria buoliana*), Bombice gallonato (*Malacosoma neustria*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 600-2000 L/ha.

**COTONE, TABACCO:** Nottua gialla del pomodoro (*Helicoverpa armigera*) 1 - 2 l/ha, utilizzando volumi d'acqua di 500-1500 L/ha.

Intervenire nella fase di schiusura uova e su larve giovani. Ripetere il trattamento dopo 7 - 10 giorni in caso di infestazione prolungata. Condizioni locali possono consigliare l'uso di RAPAX® AS in momenti specifici: in tal caso attenersi alle indicazioni tecniche regionali.

Numero massimo di trattamenti: 3.  
**Rispettare un periodo di tempo minimo di due giorni**

tra l'applicazione del prodotto fitosanitario e la raccolta delle colture commestibili per il consumo allo stato fresco.

**ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE**


RAPAX® AS può essere applicato con irroratori convenzionali che distribuiscono una quantità di acqua sufficiente a ricoprire completamente le piante infestate. Per ottenere una adeguata dispersione in acqua, prima riempire il serbatoio dell'irroratore con la quantità di acqua desiderata e poi aggiungere RAPAX® AS. Provvedere ad una moderata agitazione idraulica o meccanica durante la preparazione, il trasferimento e l'irrorazione della miscela. Per ottenere i migliori risultati agitare bene il flacone contenente il prodotto, versare la metà nell'irroratore, riagitare nuovamente il flacone con metà prodotto e versarlo nell'irroratore. Non aggiungere acqua nel flacone fino a che non è completamente vuoto. Se si vuole aggiungere un adesivante alla soluzione, aggiungerlo per ultimo. Non usare la miscela o sospensione preparata se non applicata entro 12 ore dalla preparazione. Svuotare e risciacquare completamente l'irroratore ogni volta dopo l'uso. Non contaminare le acque con i risciacqui dell'irroratore.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 21.03.2023 e modificata secondo quanto stabilito dal Comunicato del Ministero della Salute del 18 settembre 2023, relativo al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1003, con validità dal 2 ottobre 2023



Svuota e risciacqua il tuo contenitore prima di conferirlo in raccolta. Consulta le indicazioni nazionali e del tuo comune

