



Alcuni esempi di prove con NEMGUARD® SC

I seguenti grafici rappresentano la media di diverse prove dove sono stati testati 2 diversi dosaggi di NEMGUARD® SC a confronto con un Testimone Non Trattato (TNT) e una strategia chimica di riferimento. È stato rilevato l'indice di danno radicale utilizzando la scala di Zeck (da 0 a 10).




NEMGUARD® SC
indice di danno radicale su pomodoro (media di 5 prove)



NEMGUARD® SC
indice di danno radicale su melone (media di 4 prove)


Il grafico in basso rappresenta l'incremento medio produttivo su 4 colture espresso in percentuale rispetto al testimone non trattato.



NEMGUARD® SC
Incremento medio di produzione commercializzabile rispetto al Testimone non trattato


Prove con l'applicazione della strategia

NEMGUARD® GRANULES e NEMGUARD® SC




Nei grafici le sigle NEM-SC e NEM-GR indicano rispettivamente NEMguard SC e NEMguard granules.

NEMGUARD® SC
Ispica (SR)
pomodoro trapianto autunnale




NEMGUARD® SC
Licata
melone a trapianto primaverile




NEMGUARD® GRANULES
PROVA SU CAROTA
Carota cv Romance F1 (2011).
Ispica (RG), Italia.
A = alla semina (17/9/11)
Rilievi: % radici deformate, biforcute e totale radici danneggiate alla raccolta (13/1/2012)


Strategia NEMGUARD®



Strategia integrata con FUMIGAZIONE



Strategia integrata senza FUMIGAZIONE



Per ulteriori informazioni:

AREA TECNICA • Via Civinelli 1090 • 47522 CESENA (FC)
Tel +39 0547 630 336 • email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it



BIOGARD Division Sede Legale e Centro Logistico
Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035.335313 - infobiogard@cbceurope.it

Rev. Febbraio 2024



www.biogard.it

I NEMATOCIDI NEMGUARD®

La miglior combinazione tra natura e tecnologia

I NEMATOCIDI UNICI PER:
contenuto del principio attivo
efficacia comprovata
processo produttivo brevettato



L'estratto di aglio: il principio attivo che agisce contro i nematodi

L'aglio ha una lunga tradizione come pianta alimentare, impiegato anche a scopo terapeutico per le proprietà attribuitegli sia dalla scienza che dalle tradizioni popolari; ciò è dovuto al complesso di diverse molecole solforate sintetizzate nelle cellule della pianta. Quando un bulbo di aglio viene attaccato da fattori esterni o schiacciato, si avviano una serie di processi biochimici che producono sostanze di difesa, tra cui soprattutto l'alicina (la sostanza che parzialmente conferisce il caratteristico odore pungente di aglio). L'alicina è molto instabile e viene rapidamente trasformata in altri composti solforati, tra i quali i Polisolfidi. Queste sostanze (che contengono da 2 fino ad oltre 5 atomi di Zolfo – diallyl-disulfide (DAS2), diallyl-trisulfide (DAS3), diallyl-tetrasulfide (DAS4), diallyl-pentasulfide (DAS5), ecc.) sono quelle più attive nello svolgimento dell'azione nematocida. La specificità dei prodotti

NEMGUARD® è che tramite un processo produttivo brevettato (messo a punto da Ecospray Ltd, GB), dall'alicina si ottiene una maggiore presenza di polisolfidi, ad una concentrazione nota e stabile, fattore che garantisce ai formulati **NEMGUARD®** risultati consistenti e riproducibili. I polisolfidi contenuti nell'estratto di aglio agiscono per contatto e ingestione nei confronti dei nematodi (e per questo sono attivi solo contro le larve libere nel suolo). Una volta penetrati nel corpo del bersaglio, i polisolfidi interagiscono con sostanze antiossidanti, come il glutatione e diversi enzimi, essenziali per la sopravvivenza di cellule e tessuti, e quindi del nematode. Ciò determina uno squilibrio nelle reazioni di ossido-riduzione di cellule e tessuti del nematode fino a causarne la morte.

I due formulati: NEMGUARD® GRANULES e NEMGUARD® SC

Per rispondere alle esigenze operative di campo sono state sviluppate due formulazioni a base di estratto di aglio. La prima (**NEMGUARD® GRANULES**) viene impiegata al trapianto e/o alla semina delle colture, mentre la seconda (**NEMGUARD® SC**) è stata

concepita per l'impiego in fertirrigazione.

Entrambe hanno una ottima attività nematocida, che può essere adeguatamente sfruttata in funzione delle colture e delle diverse fasi del ciclo di coltivazione.

COMPOSIZIONE NEMGUARD® GRANULES

100 grammi di prodotto contengono:
Estratto d'aglio (purezza ≥ 1000 g/kg) g 45,00
Coformulanti q.b. a g 100
Formulazione: granuli (GR)
Peso specifico: 650-680 g/litro....

Classificazione:
ATTENZIONE  Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tempo di carenza: nessuno
Registrazione del Ministero della Salute: n° 16086 del 03/10/2014

Confezioni: 5 Kg
Conservazione: in luogo fresco e asciutto il prodotto è stabile per 2 anni.

Consentito in
agricoltura biologica



COMPOSIZIONE NEMGUARD® SC

100 grammi di prodotto contengono:
Estratto d'aglio (purezza ≥ 1000 g/kg) g 100
Formulazione: sospensione concentrata (SC)

Classificazione:
ATTENZIONE  Può provocare una reazione allergica cutanea.

Tempo di carenza: nessuno

Registrazione del Ministero della Salute: n° 16742 del 11/07/2017

Confezioni: 1 lt

Conservazione: in luogo fresco e asciutto il prodotto è stabile per 2 anni


Consentito in
agricoltura biologica



NEMGUARD® GRANULES

NEMGUARD® GRANULES è formulato in granuli omogenei e va applicato prima del trapianto o alla semina della coltura tramite apposite macchine seminatrici/trapiantatrici dotate di microgranulatore. Nel caso di solanacee e cucurbitacee è raccomandabile che il prodotto sia distribuito nella buchetta del trapianto al dosaggio di almeno 1 g/pianta.

NEMGUARD® GRANULES deve essere applicato in prossimità delle radici o nella zona dove insisterà la rizosfera della coltura; una volta posto nel suolo **NEMGUARD® GRANULES** libera i polisolfidi (le sostanze attive) a seguito della solubilizzazione del granulo, senza la quale non si esplica l'azione nematocida, che si protrae per 25-30 giorni. Per tale motivo è fondamentale irrigare subito dopo la semina o trapianto in assenza di piogge.







Dosaggio

NEMGUARD® GRANULES va impiegato con singola applicazione ai dosaggi raccomandati. Il calcolo del quantitativo di nematocida per pianta (nel caso di solanacee e cucurbitacee) va effettuato in modo semplice, dividendo il dosaggio/ha per il numero di piante/ha. Si ricorda che per le colture orticole è possibile avvalersi di una attrezzatura specifica (fig. 2) che permette di applicare rapidamente il quantitativo stabilito nelle buchette di trapianto.



Colture autorizzate NEMGUARD® GRANULES

	Carota	Impiego in campo.	20-25 kg/ha
	Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)	Impiego in campo e in serra.	20-25 kg/ha
	Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, anguria)	Impiego in campo e in serra.	25 kg/ha
	Lattuga e insalate	Impiego in campo e in serra.	20-25 kg/ha

NEMGUARD® SC

NEMGUARD® SC è in formulazione liquida e deve essere applicato al terreno tramite gli impianti di fertirrigazione. Grazie alla sua formulazione può essere facilmente utilizzato nei diversi momenti del ciclo colturale:



- dopo un trattamento fumigante al terreno ai primi segni di infestazione;
- a distanza di 3-4 settimane da un trattamento con nematocida granulare (come **NEMGUARD® GRANULES**);
- inserirsi in una strategia che preveda nematocidi di sintesi nella prima fase del ciclo colturale, seguita da alcuni interventi con **NEMGUARD® SC** in prossimità della raccolta.

NEMGUARD® SC si applica **esclusivamente** al suolo di coltivazione mediante impianto di irrigazione, utilizzando volumi di acqua per ciclo compresi tra 1.000-30.000 L/ha. Le migliori condizioni per l'utilizzo del prodotto fitosanitario si ottengono quando il suolo è abbastanza umido. Si raccomanda quindi di aggiungere il prodotto all'acqua di irrigazione verso la fine del ciclo di irrigazione.

Dosaggio






NEMGUARD® SC va applicato ad un dosaggio variabile da 2 a 4 litri/ha a secondo del livello di infestazione e della suscettibilità della coltura ai nematodi; per una migliore efficacia si consiglia di effettuare una serie di trattamenti (almeno 2-3 consecutivi) a distanza di 10-14 giorni uno dall'altro. Per ogni ciclo colturale è ammesso un massimo di 6 applicazioni.

Colture autorizzate* NEMGUARD® SC

	Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)	Dal trapianto alla raccolta. Impiego in campo e in serra.	2-4 litri/ha
	Cucurbitacee (melone, anguria, zucca, cetriolo e zucchini)	Dal trapianto alla raccolta. Impiego in campo e in serra.	2-4 litri/ha

* E' in corso l'allargamento di registrazione sui nematodi di brassicacee, ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili, carota, kiwi e vite.

Vantaggi dell'applicazione dei nematocidi NEMGUARD

Vantaggi dell'applicazione dei nematocidi NEMGUARD	NEMGUARD® GRANULES	NEMGUARD® SC
Efficace azione nematocida		
Nessun LMR e nessun tempo di carenza		
Compatibile con l'uso di Bombi, Ausiliari e Micorrize		
Prolungata azione nematocida	25-30 giorni	10-14 giorni
Facilità di applicazione in fertirrigazione		
Nessuna fitotossicità		
Sicuro per l'operatore e l'ambiente		
Consentito in Agricoltura Biologica	