



SPECIE PER LE QUALI SONO DISPONIBILI EROGATORI DI FEROMONE O ATTRATTIVO

MONITORAGGIO

| SPECIE | NOME COMUNE | TIPO DI EROGATORE | TRAPPOLA CONSIGLIATA |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <i>Aonidiella aurantii</i> | Cocciniglia rossa forte | standard | Planotrap/BDT |
| <i>Adoxophyes orana</i> | Capua | standard | BDT |
| <i>Anarsia lineatella</i> | Anarsia | standard / LD (rosso) | BDT |
| <i>Archips podana</i> | Cacecia dei fruttiferi | standard | BDT |
| <i>Argyrotaenia ljungiana</i> | Eulia | standard | BDT |
| <i>Bactrocera oleae</i> | Mosca dell'olivo | fialetta | Bactrap/Glutor Giallo |
| <i>Ceratitis capitata</i> | Mosca mediterranea della frutta | trimedlure | Rebell amarillo/BDT |
| <i>Cossus cossus</i> | Rodilegno rosso | fialetta | Maxi Zeuco |
| <i>Cryptoblabes gnidiella</i> | Tignola rigata degli agrumi | standard | BDT |
| <i>Cydia pomonella</i> | Carpocapsa | fialetta / LD (verde) | BDT |
| <i>Eupoecilia ambiguella</i> | Tignola della vite | standard | BDT |
| <i>Frankliniella occidentalis</i> | Tripide americano | fialetta | glutor azzurro |
| <i>Grapholita funebrana</i> | Verme delle susine | standard | BDT |
| <i>Grapholita molesta</i> | Tignola orientale del pesco | standard / LD (giallo) | BDT |
| <i>Helicoverpa armigera</i> | Nottua gialla del pomodoro | standard | BDT |
| <i>Leucoptera malifoliella</i> | Cemiostoma | standard | BDT |
| <i>Lobesia botrana</i> | Tignoletta della vite | standard / LD (azzurro) | BDT |
| <i>Mamestra brassicae</i> | Nottua del cavolo | standard | BDT |
| <i>Ostrinia nubilalis</i> | Piralide del mais | standard | BDT |
| <i>Palpita unionalis</i> | Piralide dell'olivo | standard | BDT |
| <i>Pandemis heparana</i> | Tortrice verde | standard | BDT |
| <i>Phthorimaea operculella</i> | Tignola della patata | standard | BDT |
| <i>Phyllocnistis citrella</i> | Minatrice degli agrumi | standard | BDT |
| <i>Planococcus citri</i> | Cocciniglia cotonosa degli agrumi | standard | planotrap |
| <i>Planococcus ficus</i> | Cocciniglia cotonosa della vite | standard | planotrap |
| <i>Prays citri</i> | Tignola della zagara | fialetta | BDT |
| <i>Prays oleae</i> | Tignola dell'olivo | fialetta | BDT |
| <i>Rhagoletis cerasi</i> | Mosca del ciliegio | attrattivo ammoniacale | rebell amarillo |
| <i>Rhagoletis completa</i> | Mosca del noce | attrattivo ammoniacale | rebell amarillo |
| <i>Spodoptera exigua</i> | Nottua piccola | standard | BDT |
| <i>Spodoptera littoralis</i> | Nottua mediterranea | standard | BDT |
| <i>Thaumtopoea pityocampa</i> | Processionaria del pino | fialetta | Maxi Zeuco |
| <i>Tuta absoluta</i> | Tignola del pomodoro | SELURE Ta | BDT |
| <i>Zeuzera pyrina</i> | Rodilegno giallo | fialetta | Maxi Zeuco |