



Rev. Gennaio 2026

AGRICOLLE®

Utilizzo su Orticole

COMPOSIZIONE:

Polisaccaridi

FORMULAZIONE:

Liquida

CONFEZIONI:

1 litro x 12

3 litri x 4


CONSERVAZIONE:

in luogo fresco ed asciutto al riparo della luce diretta del sole.

Agricolle è un prodotto contenente polisaccaridi a lunga catena che sono in grado di aderire in maniera specifica al corpo di piccoli insetti su foglie ed altre strutture.


Svolge un'azione esclusivamente fisica, paragonabile a quella di una trappola adesiva. Ha un'efficacia verso insetti e loro stadi di dimensioni ridotte, poco mobili (es. afidi, formiche giovanili di psille, mosche bianche); allo stesso tempo le sue caratteristiche lo rendono inoffensivo per gli insetti utili e gli impollinatori che sfuggono alla sua azione, rendendolo uno strumento efficace nelle strategie di controllo integrato.

Agricolle è applicato efficacemente in serra e in pieno campo su diverse colture in cui frequentemente si ricorre all'impiego di ausiliari, fra cui: pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, cetriolo, melone, cocomero, fragola e piccoli frutti, agrumi, pomacee e altri fruttiferi, verde ornamentale.



Quando più catene polisaccaridiche sono legate con ponti ionici Ca^{2+} , l'alginato assume una struttura 3D, né solida né liquida, molto stabile anche a temperatura ambiente.

L'insetto viene fisicamente intrappolato sulla superficie vegetale grazie all'adesione dei polisaccaridi alla superficie dell'insetto.



USO SU ORTICOLE	
Parassita	Dosaggio
Afidi	300 mL/hL
Aleurodidi	300 mL/hL
Psille	300 mL/hL
Cocciniglie	300 mL/hL
Acari (eriofidi e tetrachinidi)	300 mL/hL
Sciaridi e altri artropodi di piccole dimensioni	300 mL/hL

AREA TECNICA, BIOGARD Division

via Civinelli 1090, 47522 Cesena (FC)

Tel +39 0547 630 336

email: tecnicobiogard@cbceurope.it • www.biogard.it

BIOGARD®
biological First.



Rev. Gennaio 2026

AGRICOLLE®

Utilizzo su Orticole

PRINCIPIO ATTIVO:

Polisaccaridi

FORMULAZIONE:

Liquida

CONFEZIONI:


1 litro x 12

3 litri x 4

CONSERVAZIONE:

in luogo fresco ed asciutto al riparo della luce diretta del sole.

EFFICACIA DI AGRICOLLE CONTRO MOSCA BIANCA SU POMODORO



Località: Perpignan, Francia

Coltura: pomodoro, cv Brena

Epoca: A: 30 maggio, B: 5 giugno


Volume: 1000 L/ha

Inoculo artificiale di *Bremisia tabaci* 26 aprile

Tesi: •Testimone •Agricolle 3 L/ha •Agricolle 6 L/ha •Std. chimico pymetrozine 0,4 kg/ha (50%)

Rilievo: Conteggio del n. di adulti su 3 foglie per pianta (36 foglie/plot)

EFFICACIA DI AGRICOLLE CONTRO MOSCA BIANCA SU POMODORO DA INDUSTRIA



Località: Bosco Mesola (RA), Italia 2024

Coltura: pomodoro da industria, cv. UG11239 F1

Epoca: A: 16 agosto, B: 23 agosto

Volume: 700 L/ha

Tesi: •Testimone •Agricolle 300 mL/100 L •Naturalis 150 mL/100 L

Rilievo: Conteggio delle forme mobili (nenidi/ninfe + adulti) fino a 14 giorni dopo l'ultima applicazione (6 settembre)