



Stratiolaelaps scimitus

predatore di tripidi e larve di ditteri nel suolo

Campi e dosi di impiego

Su colture orticole ornamentali, 50 - 100 predatori/m² a livello preventivo, fino anche a 500 individui/m² in presenza del problema, localizzando la distribuzione sul substrato di coltivazione nei pressi del colletto delle piante subito dopo il trapianto.

Confezioni

S. scimitus è confezionato come stadi mobili in tubi di cartone contenenti torba

Packaging

- Tubo di cartone da 25.000 unità (**HYPOPAK**)
- Vaschetta di plastica da 125.000 unità (**HYPOSAK**)

Conservazione

Il prodotto va tenuto in un luogo fresco ed utilizzato appena possibile.

S. scimitus, già noto come *Hypoaspis miles*, è un acaro lelapide predatore terricolo che colonizza i primi centimetri di suolo vivendo a spese di piccoli artropodi od, in assenza, utilizzando residui vegetali ed altri detriti organici. Il suo impiego nei programmi di lotta biologica su colture orticole ed ornamentali contribuisce nel caso dei tripidi a contenere lo sviluppo dello stadio di pupa che si svolge appunto nel suolo. Nei substrati di coltivazione affetti da ditteri sciaridi od altre larve fitofaghe, una presenza stabile e progressiva del predatore è in grado di tenere sotto controllo duraturo le specie dannose.

