



Trissolcus basalis

parassitoide oofago di *Nezara viridula*

Campi e dosi di impiego

Trissolcus si può impiegare su pomodoro, peperone, melanzana e piante ortive (sia in serra che in pieno campo) ed erbacee in genere; i lanci si eseguono a partire dal mese di giugno o comunque alla prima comparsa della cimice verde sulla coltura, con un dosaggio di 0,5-1 individui/m² da ripetere ogni 1-2 settimane per tutto il periodo di presenza del fitofago. Aprire il tappo e lasciare uscire i parassitoidi nei pressi della pianta in più punti all'interno della coltivazione

Confezioni

T. basalis è confezionato in barattoli di plastica allo stato di adulto con strisce di carta come materiale disperdente

Packaging

- Barattoli di plastica da 500 individui (BASE)

Conservazione

Il prodotto va tenuto in un luogo fresco ed utilizzato appena possibile.

Il genere *Trissolcus* (appartenente alla famiglia degli imenotteri *Scelionidae*) comprende importanti insetti parassitoidi impiegati per la lotta biologica alle cimici. L'adulto è di piccole dimensioni (2 mm) e colore nero; le femmine si riconoscono per le antenne clavate. *T. basalis* è capace di parassitizzare intere ovature della comune cimice verde che una volta colpite assumono un colore grigiastro. La larva di trissolcus si sviluppa all'interno di uova di cimice fino allo stadio di adulto. Ogni femmina ha un'elevata capacità di ricerca e vive fino a due settimane deponendo fino a 250 uova.

