

PYREGARD®

Insetticida a base di Piretro naturale
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 3A

Composizione

- Piretrine pure g. 4,27 (40 g/L)
(da estratto di piretro 480 g/kg)
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 - Contiene estratto di piretro. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 - Tenere fuori della portata dei bambini. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti protettivi. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

CERRUS s.a.s.

via Papa Giovanni XXIII, 84 – 21040 Uboldo (VA) – Tel 02 96782108

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

CBC (Europe) Srl – via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG)

FERBI Srl - Viale Primo Maggio, Contrada Ripoli - Mosciano Sant'Angelo (TE)

Registrazione Ministero della Salute n. 18739 del 26/09/2024Distribuito da: **CBC (Europe) S.r.l.** – via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 335313

Contenuto netto: mL 15-30-100-150-200-250-500; Litri 1-5-10

Partita n.: vedere sulla confezione.

PYREGARD® marchio registrato da CBC (Europe) S.r.l.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per tutte le operazioni manuali sia in campo che in serra, durante la fase di miscelazione, carico e applicazione del prodotto indossare tuta da lavoro. Indossare tuta da lavoro e guanti durante la raccolta e le operazioni di rifinitura manuale della vite; indossare tuta da lavoro nelle attività di rientro in campo per tutte le arboree e le ornamentali. Indossare tuta da lavoro nelle attività di rientro in serra per le ornamentali.

Per proteggere gli organismi acquatici osservare una fascia di rispetto dai corpi idrici superficiali di:

- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 50% per orticole a frutto e a foglia;
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per vite;
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (in post-fioritura);
- 30 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per drupacee (in pre-fioritura);
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per agrumi;
- 20 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per pomacee;
- 10 metri vegetati con utilizzo di ugelli con riduzione della deriva del 90% per piccoli frutti.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio osservare una fascia di rispetto di 5 metri dalla zona non coltivata per drupacee, 10 metri per pomacee e agrumi.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori rispettare le seguenti misure di mitigazione:

Per agrumi e pomacee non trattare le colture in fioritura. Non utilizzare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: le piretrine bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveneni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida ad ampio spettro di azione a base di Piretro naturale in supporto liquido di origine vegetale. Agisce prevalentemente per contatto ed è caratterizzato da una rapida e buona efficacia nel controllare numerosi parassiti su diverse colture agrarie, sia in pieno campo che in serra, in tutte le stagioni. La sua breve persistenza lo rende ideale per l'utilizzo in prossimità del lancio di insetti utili.

Il prodotto è consigliato nei programmi di difesa sia integrata che biologica e nell'impiego alternato ad altri prodotti per la gestione della resistenza.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti devono essere eseguiti a inizio infestazione, prima del rilascio degli artropodi utili (per solanacee e cucurbitacee), in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche. Utilizzare volumi d'acqua e pressioni adeguate a garantire una buona copertura delle colture, curando in particolar modo la pagina inferiore delle foglie. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi, adeguare le dosi per ettolitro in modo tale da distribuire per unità di superficie la dose per ettaro indicata. Sono previsti un massimo di trattamenti per ciclo produttivo pari a 3 per agrumi, pomacee, vite e a 2 per tutte le altre colture, rispettando un intervallo minimo di 7 giorni tra un'applicazione e l'altra.

Coltura	Parassita	Dose massima di impiego		Volume di acqua hL/ha	Numero di trattamenti / Intervallo	PHI giorni
		L/ha	mL/hL			
Agrumi	Afidi	0,75	38-50	15-20	3 7 giorni	2
Pomacee (mele, pere, mele cotogne, nespole) - applicazioni post- fioritura	Psilla, Afidi	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	2
Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie)	Afidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	3
Vite (Uva da vino e uva da tavola) - applicazioni post-fioritura	Cicaline, Scafoideo	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	3
Fragola e Piccoli frutti (in pieno campo e in serra)	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili* (in pieno campo e in serra)	Afidi (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i>)	0,60	75-90	6,5-8	2 7 giorni	2
Cucurbitacee (melone, zucca, cocomero, cetriolo, zucchino in pieno campo e in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo e in serra)	Tripidi, Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Floreali e Ornamentali (in pieno campo e in serra)	Afidi, Tripidi, Aleurodidi	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	//

* Lattughe e insalate (Dolcetta/valerianella/gallinella, Lattughe, Scarola/indivia a foglie larghe, Crescione e altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea, Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), Foglie di spinaci e simili (Spinaci, Portulaca/porcellana, Bietole da foglia e da costa), Foglie di vite e specie simili, Crescione acquatico, Cicoria Witloof/cicoria belga), Erbe fresche e fiori commestibili (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico e fiori commestibili, Foglie di alloro/lauro, Dragoncello, Altri)

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Versare la dose prevista di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice parzialmente riempito d'acqua, mettere in funzione l'agitatore e completare il riempimento fino al volume desiderato. Verificare che il pH dell'acqua non sia basico (>7), se del caso stabilizzare il pH dell'acqua con i preparati autorizzati in commercio a questo scopo. Utilizzare la soluzione ottenuta lo stesso giorno della preparazione.

COMPATIBILITÀ: non compatibile con prodotti a reazione alcalina (es. Calce, Poltiglia Bordolessa alcalina, Polisorburi).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è generalmente selettivo nelle normali condizioni di impiego per le colture riportate in etichetta. Nel caso di varietà poco diffuse o di recente introduzione si consiglia di effettuare saggi preliminari su piccole superfici.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

PYREGARD®

Insetticida a base di Piretro naturale
Concentrato emulsionabile
MECCANISMO D'AZIONE: IRAC 3A

Composizione

- Piretrine pure g. 4,27 (40 g/L)
(da estratto di piretro 480 g/kg)
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410- Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208- Contiene estratto di piretro. Può provocare una reazione allergica.



CONSIGLI DI PRUDENZA

P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102- Tenere fuori della portata dei bambini. P273- Non disperdere nell'ambiente. P280- Indossare guanti protettivi. P391- Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501- Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

ATTENZIONE

CERRUS s.a.s.

via Papa Giovanni XXIII, 84 – 21040 Uboldo (VA) – Tel 02 96782108

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

Stabilimento di produzione e/o confezionamento:

CBC (Europe) Srl – via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG)
FERBI Srl - Viale Primo Maggio, Contrada Ripoli - Mosciano
Sant'Angelo (TE)

Registrazione Ministero della Salute n. 18739 del 26/09/2024

Distribuito da:

CBC (Europe) S.r.l.

via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel. 035 335313

Contenuto netto: mL 15-30-100

Partita n.: vedere sulla confezione.

PYREGARD® marchio registrato da CBC (Europe) S.r.l.

ATTENZIONE: Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.