



PYREGARD®

Insetticida a base di piretrine naturali.

COMPOSIZIONE:

Piretrine pure g. 4,27 (40 g/L)
(da estratto di piretro 480 g/kg) -
Coformulanti: q.b.a g. 100

Formulazione:

concentrato emulsionabile

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Tempo di carenza:

Vedi tabella

Registrazione del Ministero della Salute:

n. 18739 del 26/09/2024

Confezioni:

1 litro x 12
5 litri x 4

Conservazione:

Conservare il prodotto nell'imballo originale, in un luogo fresco e asciutto. Proteggere dal gelo. A temperatura ambiente il prodotto ha una stabilità garantita di almeno 2 anni.

Pyregard® è un insetticida di origine naturale a base di piretro, caratterizzato da una concentrazione elevata di principio attivo (4,27% di piretrine, pari a 40 g/L), che garantisce importanti vantaggi logistici in termini di minori volumi da stoccare, trasportare e manipolare. Efficace contro un ampio spettro di insetti fitofagi come afidi, aleurodidi, tripidi e cicaline, agisce per contatto con rapido effetto abbattente, interrompendo la trasmissione degli impulsi nervosi degli insetti colpiti.

Un impiego di particolare rilevanza è quello contro la cicalina americana della vite (*Scaphoideus titanus*), vettore della Flavescenza dorata. L'utilizzo di Pyregard®

consente di ottemperare ai trattamenti obbligatori su vite previsti dalla normativa, offrendo un'alternativa di origine naturale, efficace e compatibile con la produzione viticola sostenibile.

Grazie alla sua breve persistenza, Pyregard® consente interventi mirati e flessibili, con un basso rischio di interferenza sugli insetti utili, se applicato nelle ore più fresche della giornata o in serata. Per ottenere i migliori risultati è fondamentale una copertura uniforme della vegetazione, soprattutto sulla pagina inferiore delle foglie, dove spesso si localizzano gli insetti bersaglio.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

CULTURA	PARASSITA	DOSE MASSIMA DI IMPIEGO		VOL DI ACQUA hL/ha	N. di trt/ intervallo	PHI giorni
		L/ha	mL/hL			
Agumi	Afidi	0,75	38-50	15-20	3 7 giorni	2
Pomacee (mele, pere, mele cotogne, nespole) - applicazioni post- fioritura	Psilla, Afidi	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	2
Drupacee (pesche, nettarine, percoche, albicocche, susine, ciliegie)	Afidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	3
Vite (Uva da vino e uva da tavola) - applicazioni post-fioritura	Cicaline, Scafoideo	0,75	75-90	8-10	3 7 giorni	3
Fragola e Piccoli frutti (in pieno campo e in serra)	Tripidi, <i>Drosophila suzukii</i>	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili (in pieno campo e in serra)	Afidi (<i>Nasonovia ribisnigri</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i>)	0,75	75-90	6,5-8	2 7 giorni	2
Cucurbitacee (melone, zucca, cocomero, cetriolo, e zucchini in pieno campo e in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana in pieno campo e in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	1
Floreali e ornamentali (in pieno campo e in serra)	Afidi, Tripidi, Aleurodidi	0,75	75-90	8-10	2 7 giorni	//