



HELIOPOLIS®

ALTRI PRODOTTI

Preparato di terpeni di pino e Beta-carotene

COMPOSIZIONE:

α -pinene e β -pinene oligomeri [CAS 31393-98-3] 95,79 % p/p
Beta-carotene [CAS 7235-40-7]..... 0,01 % p/p

Formulazione:

Emulsione concentrata (EC)

Classificazione CLP:



ATTENZIONE

Confezioni:

1 litro x 12
3 litri x 4

Conservazione:

In luogo fresco ed asciutto



HELIOPOLIS® è un formulato liquido di origine naturale destinato ai trattamenti fogliari. La sua azione è di tipo fisico: dopo l'applicazione, infatti, crea sulla superficie della pianta un sottile strato protettivo trasparente, che non altera l'aspetto né lascia macchie sulla coltura. L'unicità di HELIOPOLIS® risiede nella capacità di proteggere dalle scottature, dai colpi di calore e dalla perdita di acqua dai tessuti vegetali SENZA SPORCARE, infatti il prodotto è trasparente e non lascia nessuna macchia o residuo sulle colture. Questo è particolarmente utile per colture a consumo fresco dove la copertura con polveri (es. caolino) non è possibile come il ciliegio, il pesco, il melo o anche le colture a foglia.

La particolare combinazione di **terpeni di pino**

e **beta-carotene** permette a HELIOPOLIS® di limitare gli effetti negativi dovuti a un'eccessiva esposizione ai raggi UV e di ridurre la perdita di acqua da foglie e frutti. L'efficacia della barriera fisica ha una durata media di circa due settimane; al termine di questo periodo, in presenza di temperature elevate o altre condizioni di rischio, è raccomandato ripetere il trattamento. Un nuovo intervento è consigliato anche in caso di piogge intense (che lo possono dilavare) o di rapida crescita vegetativa con formazione di nuovi tessuti non trattati. HELIOPOLIS® è compatibile con la maggior parte dei fitosanitari e dei fertilizzanti, ma si consiglia di eseguire prove preliminari su piccole superfici per verificarne la selettività.

DOSI E COLTURE

L'applicazione è indicata su colture **frutticole, orticole, industriali e vite** alla dose di **2 L/ha**. È possibile effettuare fino a 4-5 interventi per stagione, a seconda delle esigenze della coltura. Il primo trattamento va programmato in

previsione di periodi di caldo intenso e successivamente ripetuto ogni circa 14 giorni se le condizioni critiche persistono.

