

ISONET® PF plus

Feromone per il controllo di *Planococcus ficus* (Cocciniglia cotonosa della vite)
con il metodo della confusione sessuale
Prodotto con sostanza attiva evaporabile (VP)



COMPOSIZIONE:

Diffusori composti da capillare singolo
(±)-senecioato di lavandulile min. 894 g/kg.
Contenuto minimo di sostanza attiva: 165,6 mg/diffusore.
Supporto di materiale inerte.

INDICAZIONI DI PERICOLO: H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti protettivi. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRODOTTO FITOSANITARIO: Registrazione del Ministero della salute n. 19176 del 23 dicembre 2025.

CONTENUTO NETTO: 100 diffusori

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:

CBC (Europe) S.r.l., via Zanica 25, 24050 Grassobbio (BG), Italia – Tel: 035-335313

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Nishifukushima, Kubiki-ku, Joetsu-shi, Niigata 942-8601, Giappone

Riferimento Partita e Data di fabbricazione: vedere confezione

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 300-400 diffusori/ettaro secondo la tipologia della vite, la dimensione del vigneto e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di diffusori aggiuntivi, rispettando il dosaggio massimo per ettaro.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori sulla vite evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati in primavera, prima dell'inizio del primo volo dell'insetto. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. La loro durata può essere ridotta da condizioni persistenti di temperature medie molto alte e venti forti. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per 180-200 giorni.

PRECAUZIONI: In presenza di medie o alte popolazioni e nei primi anni di applicazione, è necessario predisporre una strategia combinata con insetticidi.

L'uso di insetticidi e degli ausiliari non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

CONTROLLI: nei vigneti trattati con Isonet® PF plus, installare le trappole di monitoraggio e controllarle settimanalmente per avere indicazioni sulla popolazione dell'insetto. Ispezionare periodicamente il tronco e il cordone per individuare l'inizio della migrazione dell'insetto. Successivamente, controllare le foglie basali e i grappoli al fine di valutare il livello dell'infestazione ed intervenire con insetticidi o ausiliari dove e quando necessario.

CONSERVAZIONE: nell'imballo originale ed a temperatura non superiore a 5 °C il prodotto si conserva per 2 anni.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla

conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 23 dicembre 2025.



UFI: D910-J0AG-K00D-KRJ2



Rev. 12-2025